

云ツテ奪ヒ合ツテキルノデ、追ヒ着イテ見ルト、ソレハきぬがささうノ果實デアツタ。獎メラレルママニ漿果ノ熟シタモノヲ探ツテロニ入レテ見ルト、案外ソノ味ハ素晴シイノデ驚イタ。土地ノ人々ガ好ソデ食フノモ無理ガナイ。一種云フニ言ハレヌ香リガロニ殘ツテ、一度ソノ味ヲ覺エタラモウ一生涯忘レラレヌト云フガ本當カモ知レナイ。私共ハ登山ノ際ニあかも、なつはぜ、うすのき、がんかうらん、いはなし等ノ果實ヲ生食シテキルガ、水分、甘味、香氣ノ三點ニ於テ是等ハソノ足下ニモ及バナイ不味ナモノデアル。大方ノ試食ヲ希望シテ茲ニ紹介スル。尙當地デハえんれいさうノ果實モぐりみきト稱シテ生食シテキルガ、三枚葉ノぐりみきは不味デ、トテモ高山ニアルモノノ比デハナイトイフ。(昭和 19. 9, 27)

〇八手ノ觀察 (津山・尙)

やつでバソノ花盛リノ時ニ、廣イ花盤ノ上ニ密ニ分布シタ凹所カラ蜜ヲ分泌スルコトガ知ラレテキル。コノ蜜ハ大變ニ粘性ガ強ク又相當甘味ノ濃イモノデアル。十二月ノ終頃ニナルト東京附近デハコレガ凍ツテ角バツタ結晶トナリ、朝ノ中ソレガ未ダ融ケナイ時ニ美シク花盤ノ上デ光ル。融點ハ水ヨリ餘程高イラシイガ、化學的ニヨク調べテ見タイモノデアル。

やつでハソノ枝ノ先端ニ大型ノ花序ヲ生ジテソノタメニ枝ハ一度ソコデ成長ヲ止メ、花序ノ基部カラ側方ニ春新タニ枝ヲ生ジ、一見所謂假軸分岐狀ヲナス。所ガ花ヲ生ジナイ枝ハ普通十月カラ、一月ノ間ニ新梢ヲ舊枝ノ先端ノ中央ニ生ジ假軸狀ハナサナイ。コノ新梢ハ大體花序ノ伸長ト開花ト時ヲ同ジクスルデアツテ、十一月頃迄ニ展開シタ新葉ハ東京附近デハ葉先ガ霜デイタム位デ済ムガ、十二、一月頃ノモノハ葉全體ガ枯レテシマフコトガ多い。コレハ八手ノ原產地ノ様ニ暖カク、又樹ノ下ノ陰地ノ様ナ所デハ起ラナイコトデアツテ、東京附近ノ戶外ノ冬ノ寒サハやつでニハ多少寒スギルコトヲ示シテキル様デアル。春三、四月ノ候、やつでノ果實ガスツカリ熟シテ、ソノ大部分ハ落下シタ頃ニ又花ノツイタ枝ノ基カラ旺盛ニ新梢ヲ生ジ、又先ニ伸ビヲ中止シテキタ昨年ノ新梢モ又新タニ生長ヲ初メル。櫟ノ類ニハ所謂夏芽ノ現象ガアツテ、春ト夏ト二度新梢ヲ展開スルモノガアルガ、やつでノ場合ハ可成明カニ二度ソレヲヤル。花ノアル枝ヨリノ新梢ノ展開ガナイモノヨリ數ヶ月モ遅レルコトハ、花ガ新梢ノ成長ヲ止メル役ヲ強力ニ果シテキルト考ヘラレル。即チ新梢展開ニ對シテ、負債ノ生長素ヲ有スルコトガ想像サレルソノ方面ノ學者ノ注意ヲ惹イテキルカドウデアラウカ。尤モ花ノ存在ガ葉ノ長生ヲオサヘル現象ハ何モ事新シイコトデハナク、極普通ニ見ラレルコトデアル。今年春ノ氣ノ着イタコトデハ染井吉野櫻デ花ノ咲カナイ枝ヤ病菌カ何カデ花ノ着カナイ枝ニハ著シク早く新葉(從ツデ新梢)ガ展開シテキルヲ見タ。併シ、やつでノ場合ハコレガ餘リニ著シイノデアル。コレニ對シテ冬ノ寒氣ハアマリ關與シテキナイカニ見エル。何トナレバやつでニ近イ冬暖イ小笠原島ニ産スルむにんやつでヤチちしまやつでニ於テモ亦時期ハ多少異ルガ、全く同様ノ關係が見ラレルカラデアル。